

Journal
957403/057

Dr. (Mrs) Kumari Kanita
Associate Professor

①

DII (HOW)

13-4-20

Date

--	--	--	--	--

Notes

Marwan College, Darbhanga

Conversion Hysteria

Lecture No- 8

Mob-7294039693

Q. What do you understand by conversion hysteria
Describe its symptoms, causes and treatment.

Ans. अन्य रोगों की अपेक्षा हिस्टीरिया मनःस्त्रोप (conversion hysteria) एक गंभीर मानसिक रोग माना जाता है। हिस्टीरिया के स्वरूप को जानने के लिए सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ को जानना आवश्यक है। हिस्टीरिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द 'Hysteria' से हुई है, जिसका अर्थ कु गर्भाशय होता है। अतः शाब्दिक अर्थ के आधार पर इसे गर्भाशय से सम्बन्धित मनोविकृति कहा जा सकता है। हिप्पोक्रेटीज नामक यूनानी चिकित्सक ने यह विचार व्यक्त किया कि कुल्लित गर्भाशय से रक्त रज्जा और संतान प्राप्ति की रज्जा के कारण शरीर में भ्रम उत्पन्न होता है। 34वीं यह रज्जा पूरी नहीं होने पर स्त्री हिस्टीरिया से पीड़ित हो जाती है। इसके पश्चात् फ्रायड ने इस रोग के 'विषय' के अध्ययन किये और बताया कि हिस्टीरिया का कारण कामगमित अन्तर्द्वन्द्व होता है। उन्होंने इस मानसिक रोग को Conversion hysteria कहा।

Cameron के अनुसार, "कनवर्जन प्रक्रिया वह प्रतिक्रिया वह प्रतिक्रिया है, जिसमें अचेतन-अन्तर्द्वन्द्व किसी शारीरिक लक्षण में रूपान्तरित हो जाता है। साथ ही साथ यह प्रतिक्रिया रोगी की चिन्ता और तनाव को अन्तर्द्वन्द्व की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा कम करती है।"

Coleman के अनुसार "कनवर्जन हिस्टीरिया में वह मनःस्त्रोपी प्रतिमान सम्मिलित है, जिसमें

Notes

दृष्टिक रोग निदान शास्त्र के अभाव में कुछ शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं।"

इस परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि कनवर्जिब हिस्टीरिया एक ऐसा मानसिक रोग है, जिसमें व्यक्ति का अचेतन अंग्रेज शारीरिक लक्षणों में परिवर्तित हो जाता है।

Symptoms of Hysteria :-

हिस्टीरिया के लक्षणों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। (i) ज्ञानेन्द्रिय लक्षण (Sensory Symptom)

हिस्टीरिया में कोई भी ज्ञानेन्द्रिय लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं जैसे - कान सम्बन्धी, आंख सम्बन्धी, घ्राण सम्बन्धी, चवचा सम्बन्धी और जिह्वा सम्बन्धी इन पांचों ज्ञानेन्द्रियों से पांच प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं।

- (ii) संवेदनशून्यता (Anesthesia) (iii) संवेदनशीलता का आंशिक हास (Hypesthesia) (iv) संवेदन की तीव्रता (Hyperesthesia) (v) विविध संवेदन (Paresthesia) (vi) दर्द की संवेदन की शून्यता (Analgesia) ये पांचों लक्षण पांचों ज्ञानेन्द्रियों में से किसी भी ज्ञानेन्द्रिय को प्रभावित करके उससे परिलक्षित हो सकते हैं। जैसे - कान से कन सुनना, कुछ सुनने में शीघ्रता, विचित्र शब्द सुनाई देना, आंखों की तीव्रता से सुनाई देना और कान में बिकार होने पर भी दर्द का अनुभव न होना आदि। इसी प्रकार आंखों को, चवचा तथा जिह्वा से सम्बन्धित बिकार दिखाई दे सकते हैं।

Notes

द्वितीयक के रोगियों में मुख्यता जोध असंवेदिता

(High anaesthesia), बाधिरता (Anacusia), अंधापन (Anopsia), अप्रापता (Anosmia) दे रहे जाते हैं। ये चारों लक्षण लग-ला, कान, घृणा और आँक आँदियों से सम्बन्धित हैं। इन आँदियों से सम्बन्धित द्वितीयक के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं (जो जोध असंवेदिता) —

i) जोध असंवेदिता (High anaesthesia) — इसमें सभी सम्बन्धी संवेदन समाप्त हो जाती है।

ii) अप्रापता (Anosmia) : — इसमें शक्ति की सुंघने की शक्ति समाप्त हो जाती है।

iii) अंधापन (Anopsia) : — इस लक्षण से पीड़ित रोगी के दृष्टि संवेदन समाप्त हो जाती है। एक स्त्री को कुछ दिवाई नहीं पड़ता था। जांच करने के बाद मनोवैश्लेषण से पता चला कि उस स्त्री को पुत्र की खबर थी किन्तु उसे पुत्र भी वजाय हुआ हुई। अतः वह हमेशा सोचती रहती थी कि उसकी लड़की उसके सामने न आए, ताँक उस व्यवहार के कारण लड़की भी उससे घृणा करने लगी यह घृणा इतनी बढ़ी कि उस स्त्री को दिवाई देना ही बन्द हो गया। पुत्र मनोवैश्लेषण द्वारा उसकी दृष्टि लौट आई।

iv) बाधिरता (Anacusia) : — इस लक्षण से पीड़ित रोगी के सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है।

2) वाच्य लक्षण (Motor Symptoms) : —
द्वितीयक के कुछ motor symptoms भी दे रहे जाते हैं जो इस प्रकार हैं : —

i) कंपन (Trembling) : — द्वितीयक के मध्य

Notes

और तीव्र संवेदनशीलता की स्थिति के शरीर को पकड़ लगता है।

- ii) रेंडन (Cramps) :— डिस्टीरिया का एक लक्षण पेशीय रेंडन भी होता है। पेशीय रेंडन व्यक्ति में किसी कार्य के बार-बार असमलता मिलने पर कुण्ठा की स्थिति में होती है। इसके कभी-कभी व्यक्ति शारीरिक क्रियाएं भी नहीं कर पाता।
- iii) पेशीय संकुचन (muscle contraction) :— डिस्टीरिया में व्यक्ति की मंसपैशियों के दुर्बल आ जाती हैं। इन रोगियों को कभी-कभी चलने मिलने में भी परेशानी होती है।
- iv) टिक (Tic) :— टिक भी डिस्टीरिया का एक लक्षण है। इसके चेहरे, गर्दन, हाथ-पोंव की पेशीयों में स्फुल्ल होता है। जैसे— सिर को झटकना, पलक झपकाना, मुँह के कोने का झड़कना आदि। ये गतियां स्व-चालित रूप से होती हैं और रोगी को इसका ज्ञान भी नहीं होता है। ये लक्षण आन्तरिक दुर्बल के परिणामस्वरूप होते हैं।
- v) वाणी विकार (Speech disorder) :— इसके रोगी में कुछ गलतार्थक लक्षण वाणी सम्बन्धी होते देखे जाते हैं। जैसे— आवाज बन्द हो जाना, खोंसके पर आवाज निकलना, गूँगा हो जाना, इकलाना आदि।
- vi) आघेप (convulsions) :— आघेप एक प्रकार के दौरों की स्थिति है जो कि रोगी के दौरों के खतमान ही होता है। ये दौरों आधिकांश इस समय पड़ते हैं जब रोगी अनेक व्यक्तियों के बीच होता है।

Notes

ii) लकवा (Paralysis) :— इसमें व्यक्ति के शरीर का कोई अंग निष्क्रिय हो जाता है।

iii) आन्त रोगी लक्षण (Visceral Symptoms) :— आन्त रोगी से अभिप्राय शरीर के आन्तरिक अंगों के परिलक्षित होने वाले लक्षणों से है। इनमें मुख्य लक्षण हैं— सिर दर्द, गले का बन्द हो जाना, खोसी, उल्टी, भोजन में अरुचि होना, जी मिचलाना, सोल लेने में कठिनाई आदि।

Cause of Conversion hysteria

Coleman ने हिस्टीरिया के निम्नलिखित कारणों की चर्चा की है।

1) सुझावों की अधिक ग्रहणशीलता (High acceptancy of suggestion) :— जिन व्यक्तियों का अहं दुर्बल होता है उनके सुझाव ग्रहणशीलता अधिक होती है और प्रतिबल सहनशीलता (Stress tolerance) कम होती है। वे अकारण चिन्तित रहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के Conversion hysteria के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं।

2) खतरनाक परिस्थिति में सुरक्षा (Defense against dangerous situation) :— जब व्यक्ति कयावह परिस्थिति से बचने का प्रयास करता है तो उसके अन्तर्द्वन्द्व की प्रबलता उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसे हिस्टीरिया के दौरे पड़ने लगते हैं।

3) खतरनाक इच्छाओं से सुरक्षा (Defense against dangerous desires) :— जब व्यक्ति अपनी खतरनाक इच्छाओं और आवेगों से बचाव करना चाहता है तो इस बचाव की प्रतिक्रिया के परिणाम-

6

Date

Notes

संभव है।

4) अपराध भावना और स्वयं को दण्डित करने की इच्छा (guilt feeling and self punishment desire) :- कभी-कभी व्यक्ति की अपराध भावना और conversion hysteria का कारण होती है।

5) कुछ अन्य कारण (Some other causes) :- कभी-कभी व्यक्ति द्वारा शक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों की कठिनाई conversion hysteria के कारण होती है।

Treatment

conversion hysteria के रोगी के उपचार के लिए ये विधियाँ उपयुक्त हैं :-

- 1) सम्मोहन (Hypnosis) :- प्राचीन काल में हिस्टीरिया के उपचार के लिए यह विधि अपनाई जाती थी। इस विधि के माध्यम से प्रत्येक रोगी के सम्बन्धित लक्षणों को समाप्त कर दिया जाता है। किन्तु इस विधि के द्वारा उपचार लम्बी प्रक्रिया होती है के कारण अब इस विधि को नहीं अपनाया जाता है।
- 2) मनोविश्लेषण विधि (Psycho-analysis method) :- इस विधि द्वारा कभी-कभी हिस्टीरिया का इलाज होता है। इस विधि में मनोचिकित्सक सर्वप्रथम रोगी के रोग के कारणों का पता लगाता है, तब उन कारणों को दूर करके रोगी को रोग मुक्त करता है।
- 3) साक्षात्कार विधि (Interview method) :- इस विधि में पहले रोगी से बातचीत द्वारा उसके व्यवहार तथा जीवन शैली की जानकारी प्राप्त की जाती है तब व्यवहार और जीवन शैली को परिवर्तित करके रोगी को मनो-स्थिर करने का प्रयास किया जाता है।